国家市场监督管理总局国产保健食品
注册证书

产品名称	森灵石草牌淫羊藿灵芝胶囊		
注册人	樟树市益康药业有限公司		
注册人地址	江西省宜春市樟树市永泰镇洋塘洲105国道旁		
审批结论	经审核，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《保健食品注册与备案管理办法》的规定，现予批准注册。		
注册号	国食健注G 20240272	有效期至	2029年07月01日
附件	附1 产品说明书、附2 产品技术要求		
备注	2024年07月02日，批准该产品转让技术。转让方为今安健康产业股份有限公司，产品名称藤冈牌淫羊藿灵芝胶囊（注册号国食健注G 20090576）同时注销。

国家市场监督管理总局
保健食品产品说明书

国食健注G 20240272

森灵石草牌淫羊藿灵芝胶囊

【原料】淫羊藿、灵芝、西洋参、蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉

【辅料】无

【标志性成分及含量】每100g含：腺苷 150mg、总皂苷 330mg

【适宜人群】易疲劳者

【不适宜人群】少年儿童、孕妇、乳母

【保健功能】本品经动物实验评价，具有缓解体力疲劳的保健功能

【食用量及食用方法】每日2次，每次2粒，口服

【规格】0.4g/粒

【贮藏方法】阴凉干燥处保存

【保质期】24个月

【注意事项】本品不能代替药物；适宜人群外的人群不推荐食用本产品

国家市场监督管理总局 保健食品产品技术要求

国食健注G 20240272

森灵石草牌淫羊藿灵芝胶囊

【原料】淫羊藿、灵芝、西洋参、蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉

【辅料】无

【生产工艺】本品经提取（淫羊藿、西洋参：分别加入10、8倍量70%乙醇回流提取2次，每次1.5h；醇提后的药渣加入灵芝后分别加入12、10倍量水煎煮提取2次，每次2h）、过滤、浓缩、喷雾干燥、混合、制粒、装囊、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】固体药用高密度聚乙烯瓶应符合YBB00122002的规定。

【感官要求】应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	指标
色泽	内容物呈棕褐色至黑褐色
滋味、气味	具中药气味，微苦
状态	硬胶囊，完整，内容物为颗粒，无肉眼可见的外来杂质

【鉴别】无

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项目	指标	检测方法
铅（以Pb计），mg/kg	≤ 2.0	GB 5009.12
总砷（以As计），mg/kg	≤ 1.0	GB 5009.11
总汞（以Hg计），mg/kg	≤ 0.3	GB 5009.17
水分，%	≤ 8	GB 5009.3
灰分，%	≤ 12	GB 5009.4
崩解时限，min	≤ 30	《中华人民共和国药典》
六六六，mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤ 0.1	GB/T 5009.19

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项目	指标	检测方法
菌落总数，CFU/g	≤ 30000	GB 4789.2
大肠菌群，MPN/g	≤ 0.92	GB 4789.3 MPN计数法
霉菌和酵母，CFU/g	≤ 50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	$\leq 0/25g$	GB 4789.10
沙门氏菌	$\leq 0/25g$	GB 4789.4

【标志性成分指标】应符合表4的规定。

表4 标志性成分指标

项 目	指 标	检测方法
腺苷, m g/100g	≥150	1腺苷的测定
总皂苷(以人参皂苷Re计), m g/100g	≥330	2总皂苷的测定

1 腺苷的测定(来源于《保健食品检验与评价技术规范》(2003年版))

1.1 试剂

除非另有说明, 在分析中仅使用双蒸水。

1.1.1 磷酸二氢钾: 分析纯。

1.1.2 无水乙醇: 优级纯。

1.1.3 甲醇: 优级纯。

1.1.4 提取液: 乙醇-水=3:2。

1.1.5 腺苷标准溶液: 准确称量腺苷标准品0.0100g,加入水溶解并定容至25m L。此溶液每m L含0.4m g腺苷。

1.2 仪器

1.2.1 高效液相色谱仪: 附紫外检测器(UV)。

1.2.2 超声波清洗器。

1.2.3 离心机。

1.3 分析步骤

1.3.1 试样处理: 称取试样0.5g,精密称定, 于25m L容量瓶中, 加入约20m L提取液, 超声提取10m in。取出后加入提取液定容至刻度, 混匀后以3000r/m in离心3m in。经0.45 μm 滤膜过滤后供液相色谱分析用。

1.3.2 液相色谱参考条件

1.3.2.1 色谱柱: C₁₈柱, 4.6×150m m, 5 μm。

1.3.2.2 柱温: 室温。

1.3.2.3 紫外检测器: 检测波长254nm。

1.3.2.4 流动相: 甲醇-0.01m o/L磷酸二氢钾溶液=10:90。

1.3.2.5 流速: 1.0m L/m in。

1.3.2.6 进样量: 10 μL。

1.3.2.7 色谱分析: 取10 μL标准溶液及试样溶液注入色谱仪, 以保留时间定性, 以试样峰高或峰面积与标准比较定量。

1.3.3 标准曲线制备: 分别配制浓度为0.400、2.00、4.00、20.0、60.0 μg/m L腺苷标准溶液, 在给定的仪器条件下进行液相色谱分析, 以峰高或峰面积对浓度作标准曲线。

1.3.4 分析结果的表示

1.3.4.1 计算

$$X = h_1 \times C \times V / (h_2 \times m \times 1000)$$

式中:

X—试样中腺苷的含量, m g/g;

h₁—试样峰高或峰面积;

C—标准溶液浓度, μg/m L;

V—试样定容体积, m L;

h₂—标准溶液峰高或峰面积;

m—试样质量, g。

1.3.4.2 结果表示: 计算结果保留三位有效数字。

2 总皂苷的测定(来源于《保健食品检验与评价技术规范》(2003年版))

2.1 试剂

2.1.1 Am berlite-XAD -2大孔树脂, Sigm a化学公司、U.S.A。

2.1.2 正丁醇: 分析纯。

2.1.3 乙醇: 分析纯。

2.1.4 中性氧化铝: 层析用, 100-200目。

2.1.5 人参皂苷Re: 购自中国食品药品检定研究院。

2.1.6 香草醛溶液: 称取5g香草醛, 加冰乙酸溶解并定容至100m L。

2.1.7 高氯酸: 分析纯。

2.1.8 冰乙酸: 分析纯。

2.1.9 人参皂苷Re标准溶液: 精确称取人参皂苷Re标准品0.020g, 用甲醇溶解并定容至10.0m L, 即每毫升含人参皂

昔Re2.0m g。

2.2 仪器

2.2.1 比色计。

2.2.2 层析柱。

2.3 实验步骤

2.3.1 试样处理：称取1.0g左右的试样（根据试样含总皂苷量定），置于100m L容量瓶中，加少量水，超声30m in，再用水定容至100m L，摇匀，放置，吸取上清液1.0m L进行柱层析。

2.3.2 柱层析：用10m L注射器作层析管，内装3cm Am berlite-XAD -2大孔树脂，上加1cm 中性氧化铝。先用25m L70% 乙醇洗柱，弃去洗脱液，再用25m L水洗柱，弃去洗脱液，精确加入1.0m L已处理好的试样溶液（见2.3.1），用25m L水洗柱，弃去洗脱液，用25m L70% 乙醇洗脱人参皂苷，收集洗脱液于蒸发皿中，置于60℃水浴挥干。以此作显色用。

2.3.3 显色：在上述已挥干的蒸发皿中准确加入0.2m L5% 香草醛冰乙酸溶液，转动蒸发皿，使残渣都溶解，再加0.8m L高氯酸，混匀后移入5m L带塞刻度离心管中，60℃水浴上加热10m in，取出，冰浴冷却后，准确加入冰乙酸5.0m L，摇匀后，以1cm 比色池于560nm 波长处与标准管一起进行比色测定。

2.3.4 标准管：吸取人参皂苷Re标准溶液（2.0m g/m L）100 μL放蒸发皿中，放在水浴挥干（低于60℃），或热风吹干（勿使过热），以下操作从“2.3.2柱层析…”起，与试样相同。测定吸光度值。

2.4 计算：

$$X = A_1/A_2 \times C \times V/m \times 100/1000 \times 1/1000$$

式中：

X—试样中总皂苷含量（以人参皂苷Re计），g/100g；

A₁—被测液的吸光度值；

A₂—标准液的吸光度值；

C—标准管人参皂苷Re的量，μg；

V—试样稀释体积，m L；

m—试样质量，g。

计算结果保留二位有效数字。

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

应符合《中华人民共和国药典》中制剂通则项下“胶囊剂”的规定。

【原辅料质量要求】

【原辅料质量要求】

- 1.淫羊藿：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
- 2.灵芝：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
- 3.西洋参：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
- 4.蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉

项 目	指 标
来源	蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉 (<i>Paecilomyces hepiali</i>)
制法	经发酵 (25℃, pH: 5, 72h)、过滤、干燥 (95±5℃)、粉碎、过筛、包装等主要工艺加工制成。
感官要求	浅棕色粉末状, 具本品特有的香味, 味微苦, 无异味, 无杂质
多糖 (以无水葡萄糖计), g/100g	≥4.0
水分, g/100g	≤8.0
灰分, g/100g	≤8.0
甘露醇类物质, g/100g	≥8.0
腺苷, mg/100g	≥180.0
蛋白质, g/100g	≥25.0
铅 (以Pb计), mg/kg	≤2.0
总砷 (以As计), mg/kg	≤1.0
总汞 (以Hg计), mg/kg	≤0.3
菌落总数, CFU/g	≤30000
大肠菌群, MPN/g	≤0.92
霉菌和酵母, CFU/g	≤50
金黄色葡萄球菌	≤0/25g
沙门氏菌	≤0/25g

- 5.明胶空心胶囊：应符合《中华人民共和国药典》的规定。